

Una sobredosis ocurre cuando alguien consume demasiada cantidad de un opiode.

Una persona que ha sufrido una sobredosis no podrá despertarse ni hablar con usted.

Su respiración puede ser lenta y superficial.

Es posible que no esté respirando en absoluto.



Find
Naloxone
NowKY

FindNaloxoneNowKY.org

¡Administre Naloxona!

La naloxona revierte la sobredosis. ¡Actúe rápido!

Abrir

Despegue el papel de aluminio y retire el aerosol nasal.



Colocar

Inserte suavemente la boquilla en su fosa nasal.



Apretar

Presione el émbolo hasta el fondo hasta que haga clic.



¡El aerosol nasal de naloxona tarda de 2 a 3 minutos en hacer efecto! Espere al menos 2 minutos para ver una respuesta antes de administrar más. ¡Llame al 911!
Realice respiraciones de rescate mientras espera.



Una persona que ha sufrido una sobredosis puede despertarse después de la administración de naloxona o puede permanecer inconsciente.

Si alguien que recibió naloxona está respirando lentamente, superficialmente o no respira en absoluto, la respiración de rescate es esencial.

¡Dele respiraciones de rescate!

1. Colóquelo de espaldas (boca arriba). Asegúrese de que la persona no tenga nada en la boca.
2. Aplique una máscara de barrera, si está disponible. Inclíne su cabeza hacia atrás, levante su mentón y pellizque su nariz para cerrarla. Esto abre la vía aérea.
3. Sople lentamente boca a boca, observando cómo se eleva su pecho.
4. Continúe dando un sople cada cinco segundos.
5. Si comienza a hacer gorgoteos o a respirar por sí mismo, deténgase y colóquelo de lado en posición de recuperación.

Pasos 1 - 2



Pasos 3 - 4



Paso 5

